

# 大腸内視鏡検査

## (目的)

大腸内視鏡検査は、内視鏡により大腸の中を観察し、大腸の病気やポリープなどを見つけるための検査です。

(年間検査件数) 3,000 件以上 (ポリープ切除含む) を行っています

## (検査前処置方法)

### ★下剤の飲み方

1. 前日の夜下剤を服用する；**前日自宅ニフレック**
2. 検査当日の朝下剤を服用する；**自宅ニフレック**
3. 検査当日病院に来てから服用する；**院内ニフレック**

合計3種類あります

### ★下剤の種類

1. ニフレック (2L の水に溶かした下剤で味に少し特徴があります)



2. ビジクリア (50錠を2Lの水かお茶で服用する下剤で、味はありません)



## (内視鏡室の設備)

下剤服用場所；内視鏡センター待合室 (全席 12 席)



待合室

トイレ数；内視鏡センター内に 3 か所

このドアの奥に  
1 か所あります



検査室数；1 室 (部屋が空いている場合は 2 室で行うこともある)

## (衛生管理)

内視鏡洗浄機 4 台保有しており、ガイドラインを準拠して、内視鏡検査一件ごとに手洗いと内視鏡洗浄機にて洗浄・消毒しております

(自宅でニフレック服用時のQ&A)

1. ニフレックが飲みにくいのですがどうすればいいですか？

A:冷たくすると飲みやすくなる場合もあるので、氷などで冷やしてお飲みください。(個人差があります)

2. ニフレックを飲んでいて気持ち悪くなったのですが、どうすればいいですか？

A:ニフレックを飲むペースを、少しゆっくりにしてください。

1L位飲んだあと胃に下剤が溜まり気持ち悪い時もあるので、おなかをマッサージしたり、動いて下剤が腸に流れるようにしてください。

※勝手に下剤を中止すると、便がきれいにならない時もあるので必ず病院へ相談してください。

3. 朝自宅でニフレックを飲んでいたら、気持ち悪くて飲めなくなりました。どうすればいいですか？

A:病院で続きを飲んで頂きますので、下剤を持って予約時間より早めに病院へお越し下さい。

4. 自宅ニフレックの場合、検査食だけでは量が少ないのですが、何かほかに食べてもいいですか？

A:ゼリー1~2個・具の入っていないスープや味噌汁・粒々の入っていないジュースやお茶であれば差し支えありません。

5. 下剤を飲んでも便が出ないので、どうすればいいですか？

A:おなかの痛みがなければ、右から左にマッサージしたり、体をひねったり、動いたりしてください。それでも出なければ、病院で浣腸を行いますので案内時間に病院へお越しください。